

Conséquences du sous traitement du cancer du sein chez la femme âgée

H. Zidane ^{1*}, B. Larbaoui ², H.A. Dib ³, M. Khettab ⁴

(1) CHU de Mostaganem, Algérie.(2), CLCC d'Oran, Algérie,(3) CLCC de Sétif, Algérie,(4) CHU de la Réunion, Saint Pierre France



Introduction

Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde. Plusieurs études soulignent le sous traitement chez les patientes âgées.

But

évaluer le taux de non conformité aux thérapeutiques (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée) et son impact sur la survie des patientes âgées.

Patients et méthodes

Etude rétrospective monocentrique, porte sur 109 patientes âge >70 ans, traitées et suivies pour cancer du sein entre le 1^e jan. 2016 et le 31 déc. 2018 au niveau du CLCC de Sétif.

Résultats

L'âge moyen: 77,9 ans. 81,6% des patients avaient au moins une comorbidité. Mode de découverte: autopalpation chez 91,7% des cas. T1: 6,4%, T2 : 43,1%, T3 : 25,7% et T4: 21,1%. CCI dans 70,6% des cas et 68,8% SBRII. pN+: 57,9% chez 44 patientes / 76 opérées. 22 patientes M0. RH+ 74,3%. HER 2 surexprimé: 22%




Fig.1 : Taux de non-conformité aux thérapeutiques (109 patientes)

Arme thérapeutique	Conforme	Non conforme	*P
Radiothérapie	100,0%	80,0%	0,003
Chimiothérapie	92,7%	72,6%	0,033
Hormonothérapie	92,7%	Pas de cas	
Thérapie ciblée	90,0%	83,3%	0,74

* la probabilité P a été calculé par la méthode log Rank de l'analyse de survie

Tableau.1 : Taux de survie globale à 3 ans (cohorte des patientes M0)

Le taux de non-conformité

La chimiothérapie (40,2%), la thérapie ciblée (30,8%), la radiothérapie (23,9%), l'hormonothérapie (12,9%) et la chirurgie (11,9%).

Le taux moyen de non-conformité pour les 5 thérapeutiques est de 23,9%.

Conclusion

- Nouvelles informations sur la conformité aux recommandations dans le traitement du cancer du sein des personnes âgées.
- Le sous traitement des patientes a eu un impact sur la survie.
- Nécessité de l'introduction de l'évaluation oncogériatrique pour une prise en charge optimale.
- D'autres études sont donc nécessaires pour dresser un profil exhaustif de la prise en charge oncogériatrique du cancer du sein en Algérie.