

# Observance thérapeutique chez les patientes ayant un cancer du sein, étude des traitements médicamenteux oraux

Analyse issue des données du système national des données de santé



Rinder P. (1), Sinel-Boucher P. (1), Marcille T. (1), Hornus P. (1), Szeftel D. (1), Bros V. (2), Heudel P.E. (3), Bernard-Marty C. (4), Kanoun D. (4), Levy C. (5), Teixeira L. (6)  
(1) Sêmeia, Paris, (2) Pfizer, Paris, (3) Centre Leon Berard, Lyon, (4) Clinique Pasteur, Toulouse (5) Centre François Baclesse, Caen, (6) Hôpital Saint Louis AP-HP, Paris


## Objectif

Mesurer la **persistance** et l'**observance** aux traitements médicamenteux oraux délivrés en **pharmacie de ville** parmi les femmes atteintes d'un cancer du sein.

## Population

Les données proviennent du SNDS (Système National des Données de Santé). L'étude concerne les patientes adultes ayant eu un diagnostic de cancer du sein entre 2013 et 2018 : **210 000** patientes atteintes d'un cancer du sein localisé et **40 000** atteintes d'un cancer du sein métastatique.

Répartition de l'âge dans les deux cohortes



## Méthode




Une patiente est non persistante si elle n'a plus de stock médicamenteux pendant 2 mois (thérapies ciblées ou chimiothérapies orales) ou 3 mois (hormonothérapies) sans changement de traitement, entrée en soins palliatifs ou décès. L'observance est estimée par le **MPR** (Medication Possession Ratio, rapport entre le nombre de jours de traitement délivrés et le nombre de jours avant un nouveau passage en pharmacie). Une patiente est considérée comme non observante si le MPR de ses trois prochains achats est **inférieur à 80%**.

## Observance

Pourcentage de patientes avec au moins un épisode de non observance :

Cohorte	Localisé	Métastatique	Cohorte	Métastatique
Ensemble des patientes	41 %	46 %	Hormonothérapie	43 %
Bénéficiaires de la CMU-C	48 %	49 %	Thérapie ciblée	35 %
Non bénéficiaires de la CMU-C	40 %	46 %	Chimiothérapie orale	53 %
≤ 50 ans	43 %	45 %		
50 – 70 ans	39 %	47 %		
≥ 70 ans	37 %	43 %		

## Persistance



Courbes de Aalen-Johansen

## Conclusion

Les patientes atteintes d'un cancer du sein localisé ont tendance à être moins persistantes, mais plus observantes que les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique.