

Iris Bonomo<sup>1</sup>, Christine Tunon de Lara<sup>1</sup>, Hélène Charitansky<sup>1</sup>, Julie Babin-Commeny<sup>1</sup>, Sophie Auriol-Leizagoyen<sup>1</sup>, Marion Fournier<sup>1</sup>

1. Département de chirurgie mammaire et reconstruction, Institut Bergonié, Bordeaux, France

## Introduction

L'hémi-mastectomie supérieure à pédicule inférieur est une technique de chirurgie oncoplastique permettant une exérèse complète des quadrants supérieurs. Suite à la présentation de cette technique au congrès de la SFSPM 2022 par le Docteur Monique Cohen, nous avons souhaité évaluer cette technique à l'Institut Bergonié.

## Méthode

Revue rétrospective unicentrique (Institut Bergonié, Centre de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux) de 6 cas ayant été pris en charge par hémi-mastectomie supérieure à pédicule inférieur entre décembre 2022 et Juin 2023. L'objectif était d'évaluer la faisabilité de la technique, la sécurité oncologique (évaluer sur base d'une chirurgie R0), les complications postopératoires à 30 jours et le résultat esthétique.

## Résultats

Le temps moyen d'intervention était de 96,4 min. Le poids moyen de la pièce opératoire était de 164,6 grammes (min 59,6 - max 450gr). Deux patientes étaient R1 in situ sur la pièce opératoire avec reprise par mastectomie totale (33,3%). 4 patientes étaient R0 (66,6%). Deux patientes ont eu une prise en charge ambulatoire, 3 patients sont restés hospitalisées 1 nuit et 1 patientes est restée 2 nuits. Aucune complication majeure n'a été observée. Deux patientes ont présenté une souffrance de la plaque aréolo-mamelonnaire traitée par soins infirmiers prolongés et 1 patiente a présenté des douleurs ayant nécessité la prise de GABAPENTINE. Au niveau du résultat esthétique, les 4 patientes se disaient satisfaites (2 données manquantes dans le dossier). Du point de vue du chirurgien, le résultat esthétique était, dans les 6 cas, très satisfaisant à 3 semaines post-opératoire.



Photo post-opératoire à 3 semaine : Mme A




Photo post-opératoire à 3 semaines : Mme B



Photo Mme C à 6 mois



Photo préopératoire Mme G




Photo post-opératoire à 3 semaines: Mme G, nécrose partielle de la PAM



Photo Mme G à 6 mois

## Conclusion

L'hémi-mastectomie supérieure est une technique faisable, reproductible et fiable. Quatre patientes sur 6 ont pu éviter une mastectomie avec un résultats esthétique tout à fait satisfaisant. Pas de complication majeure observée.